

**POICHÉ LA TOSSE  
CONVULSIVA È UNA  
DELLE MALATTIE LE  
PIÙ OSTINATE, E LE  
PIÙ MOLESTE, E...**

---

Jacopo Penada



POICHÉ LA TOSSE CONVULSIVA È UNA DELLE MALATTIE LE PIÙ OSTINATE, E LE PIÙ MOLESTE, E MICIDIALE, ED È QUINDI ESSENZIALE CHE I MEDICI SE NE OCCUPINO CON TUTTA L'ATTENZIONE CERCARE QUAL SIA LA TEORIA PIÙ ESATTA DI TALE INFERMITÀ, E QUALE IL MEGLIOR METODO DA GUARIRLA.

# MEMORIA

DEL SIGNORE

**IACOPO PENADA**

*Ché se approvata l'Accademia della Scienze e Lettere  
della Svezia nel 29 Novembre 1814.*



**PERONA**

DALLA TIPOGRAFIA MARCHESI

1814.

.....

*Se Modelului nostru experiential privind instructia:*  
*alt experiential rational la limita condacurata.*

.....



## PARTE PRIMA

**L**La *Facc. Crivelliana*, nella più rinomata specie della sua comparsa nelle nostre Pagine, era una malattia quasi esclusivamente propria della più tenace Socialismo, in seguito si rese sempre più acuta, e finalmente in maniera, che si propagò, e si fece ad attaccare non tanto i fanciulli, quanto le adulte persone; e prima si dichiarò a frangere, e confondere una vera e propria serie di mali d'ogni specie, con tanto danno della umana salute.

Supponiamo dunque però la quello, che antiché la illustre Società Italiana di proporre agli ingegni Italiani addetti all'Arte Salutare, il Problema, in cui si ricerca in-Quid sit la *Tigna* più acuta di tale deformità, e quale il miglior metodo di cura.

Arragache però intorno ad un tale importantissimo argomento, una serie molto distinta di Scrittori con nostrali, come forestieri si siano fedelmente occupati; pur tuttavia avendo che il loro nome si va sempre più dilatando, ed insieme aumentando stragi molto maggiori, con diverse cose molto nocive, che sopra di Essi si venì di proposito, e si cercò di far finire a quest'idea sempre più rinvenuta a parte danno della umana umanità.

Per la qual cosa io pare da von Filantropia animato, e per la non dubbia via della ragione, e della spietata diligente il mio ragionamento, cercò discendere in quest'analisi, e dell'idea palestr, in cui se dato non sia base di giungere alla bramata meta, potrà almeno ripetere col Foco, che per me.

*Est quidam prodes tunc, si non datur ultra.*

*Epoca della prima comparsa in Europa della Tossicomania, o Frenesia.*

Questo singolare male non fu per verità ignoto ad Ippocrate, ed a più vetusti Medici della veneranda antichità; *habebat* essere potendo che lo riconoscano i Greci, ed i Latini, e di fatto *Paulus Aegineta* suppone che sotto l'antico nome di *Tussim deliramentum, suffocamentum, formam*, fosse noto ad Ippocrate il miserabile male.

Non pertanto sembra ragionevole il supporre che questa malattia sia stata a noi recata dalla più recente Africana Provincia, alla stessa guisa, che ci fu apportato il Tifoide, la Rosolia, il mal Venereo, ed altre comuni morbosità.

Colto volgare del tempo ha sempre più riconosciuto la malattia, quando il *diabonismo* la chiamò *Syrtaria*, ed il *Milano* fu il primo, che accettò questa Tossicomania, col nome di *Comulencia*.

In Francia incominciò da un'epoca dove la più suntuosa d'ogn'altra delle nostre regioni a manifestarsi la vera Tossicomania; *Francisco Fabricius* ne segna la prima comparsa nel secolo XVI ed in età non al secolo con il *sig. Marco de Rouvray*, che la stabilisce solo un primordio del secolo XVIII. L'inglese *Stearn* nel 1709 assicura di averla osservata Epidemica allora in Madaga, e nella Jamaica (a).

Il celebre *Morandus* parlò nel suo trattato: *De puerorum Morbis* scritto nell'anno 1535 (b) non fa parola della vera Tossicomania Epidemica, e parla soltanto della Tossicomania in genere, e coi cadaveri soggetti i facciali tumidi, e puerili, prossimi in tali loro, della distillazione della tossa in bronchi, ed al polmone, di quella se fredda, se calda, mucosa,

(a) *Stearn*, *Traité de Madaga, et de la Jamaïque*. Anni. 1709.

(b) *Morandus de Puerorum Morbis*. Lib. 2.

che a que' tempi era creduta ancora cosa efficace di mol-  
tissimi mali, ed il Francesco panofani, che nel fine del  
secolo decimo sesto pubblicò un nuovo trattato del mali in-  
fantili, non fa cenno della Tosa Corvularia, ma soltanto  
della Tosa per distillazione, siccome ne parla lo stesso Mi-  
croscopio [a].

Questo morbo però nella prima sua causa osservato in  
Francia ottenne un nome suo proprio, e fu chiamato coque-  
luche, e ciò perchè i fanciulli, che ne rimanevano attan-  
nati, vedevano coperti nella testa con una beretta, o capu-  
cio, da nomarsi *Franchi* col nome di *capuciale* appunto  
contadinesco, ed ciò si fece senza ragione, mentre inten-  
devano essi, e gli stessi Medici di que' tempi, d'impedire con  
quel riparo la diffusione, o contagio del morbo sì polmoni,  
di quella ferida, ed infante moribondo, supposto la causa prin-  
cipale dello stesso morbo.

Essi però osservato l'onore di distruggere l'ancora spi-  
rituale della illusione del capo alla sottoposta parte, all'El-  
monio, e quindi col mezzo della sistematica perquisizione  
al Padli, e *Ricardo Lower*, allo *Simens*, e finalmente al  
dotto nostro *Willis*.

Difesa in seguito l'influenza di un così fatto morbo per tut-  
ta l'Europa, anzi più vi scompare, anzi diventa sempre più  
rarissima ed epidemica, nessuno vedremo a suo luogo.

Senza però provenir dal manovaro del Medico Scitoco-  
ri, che si occupava nell'investigare le spoglie, la forma la  
natura della Tosa Corvularia, che i popoli Meridionali dell'  
Europa sono stati più prontamente intesi dal morbo primario,  
che quelli del Nord, e da più sveduta prova ad eviden-  
za, che nei popoli Settentrionali la Tosa Corvularia ha ma-  
no frequente ne' suoi stadii, meno forte, e terribile nelle  
sue conseguenze, che nei paesi posti alla piaga più alta, e  
meridionale della Francia, e dell'Italia.

[a] Trattato Jacobi de Panofani, cum-Gual. Scabato Florent. 1596.

Una parte essenziale da noi gli scritti del Molini osservatori italiani ha potuto studiare, oltre da trenta anni a questa parte abbiamo avuto la Toza Conoscenza Epidemica tra di noi più di quindici volte; cioè negli anni 1781, 1786, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, osservando che sempre più frequentano ora le fatali ricorrenze del morbo presente, quanto più si avvicina ai nostri giorni, e vedremo poi in altro Capitolo, sotto a questa forma comporre, e con queste lettere spiegar di morbi epidemici si vedono sempre più combinando, e frammischando la Toza Conoscenza delle cose con trattare

## 0400 00

*Differenze essenziali, e caratteristiche della Torre Consolare, che la distinguono dalle altre Tori, e una nuova particolare.*

La Targa è un sistema complessivo della maggior parte della malattia tanto acuta, che cronica di petto; e così prende di tutto la malattia articolare, e di non poche che tengono la loro base nella viciosa abitudine, quali sarebbero le gastriche, le tifiche, e sopra tutto quelle, che sotto la forma si presentano di varicose, ed eruttative d'ogni maniera.

Tutta questa dialettica della Tesi appartiene in realtà spesso di molto, non presentando mai i veri caratteristici funzionali della Tesi propriamente Critica-Esplicita.

La Tossè Compravà però generalmente considerata a me-  
sindole, che altra non sia, che una più o meno violenta con-  
vulsione non naturale dell'organo polmonale, e della trachea,  
prodotta dalla irregolare contrazione delle potenze tono-  
muscolari, che in particolar modo sono inserenti alla respira-  
zione, per cui quegli organi tendono ad espellere quel certa-  
to quel materiale estraneo, ed irritato in parti che sta loro  
e costretto, e che ad esse meccanicamente aderisce.

*Schleier*, e con due molti altri scrittori nominati pongono la causa efficiente della loro nel solo irritamento del nervi della laringe, dell'aperta arteria, de' bronchi; l'osservazione *Albre* però piovvi ad evidenza, e sperimenti, che irritato agli animali a bella posta le summentovate parti non vi è seguito verun effetto di tosse, quindi mostrò brevemente in 86 alla modo in animali non irritando, nel mal-pelle, nel sangue acri internum manifestarono apertis arteriis, nel frangimento nel diaphragmatico, nel nervum intercostalem filum effuso peraliam Tassam.

Che se poi dalla van Tassé Cavallera si può, questa come i suoi più marcati e patologometrici sistemi, ed è prodotta da una causa particolare, la quale naturalmente si riconosce facilmente la contraddistintione da tutte le altre tosse,

E per venti tempo rimane appreso al misero fanciullo colto dal parossismo della vera tosse: una forte, e convulsiva di rifugiarsi nel suo materasso, che appoggiato ad un tratto dell'incassato cuscino di tufo, e con violente inspirazioni che deve fare, comincia a dibattersi violentemente sollevando in piedi la testa, indi fatto convulso con gli occhi convulsivi, e lacrimevoli, ed uscupato il corvo fibroso del sangue poi tali palmonali, si fa livido nella faccia, nel collo, nel petto, scintilla nel languente il respiro, che quasi mai non da nessun modo istruimento ricomincia; quindi arriva come patteggiando con voce rauca, e disagevole; indi tosse, e gela ad un punto; il sangue correnti talia gli scoppia a largo mappella dalla narici, dalla bocca, dagli occhi; depone involontario le facce, e le urine, rimanda dalla bocca, e dalle fianchi sulla copra di vecchissima musca, poi spesso arriva alle «*Emetici*» vomitano violentemente vomitar; e finalmente in un qualche delirio, e languente prostrato parossismo, arriva, inebrieggia, e talvolta come parla momentaneamente soffocato, ed obliato.

E per ciò poi che riguarda quella lenta mucosa materia, che nel cavillato della Tasse Cavallera viene separata dagli



attaccati dal morbo stesso; questa appunto da molti Autori fu esibita come la vera causa efficiente della Tosse Convulsiva; la quale volendosi singolarmente la tonaca del ventricolo, vi contiene una sparsa contenzione; che poi successivamente propagata alle fibre nervose, e muscolari più propriamente intervenni all'azione della respirazione, vi rivolgevasi tutto tutto gli stituchi della Tosse Convulsiva.

Quindi i Medici singolarmente oltremontani, ed il Sig. Boissier<sup>1</sup> universalmente citato nel Commentary di Epoca Tome 2.<sup>a</sup>, pag. 55, e con esso molti altri condottieri di poter adeguatamente porre il nome di Tosse stomacale alla Tosse Convulsiva, sulla supposizione appunto che nelle stomaco più che in ogni altra parte aver potesse la sua primizia sede, e stabilimento (a). Io però mi trovo inclinato ad ammettere l'opinione del Signor Boissier de Boissier<sup>2</sup>, il quale suppone che quella stessa sostanza, che viene espulsa dagli attaccati della Tosse Convulsiva, sia piuttosto un effetto di quella agguia morbida che esiste in stessa Tosse, la quale agguia fortemente sulle ghiandole mucose, e salivari, le costringe a separare una maggior quantità di muco, che non separerebbero la loro natura; nella stessa guisa (dice il così citato Autore) che le ghiandole della voce umana mandano più muco d'or che esse vengono irritate o dalla presenza dell'alcol, o da altra simile morbosità.

Quasi tutti però i Scrittori concordano a stabilire la Tosse Convulsiva veramente contagiosa, e quindi essere epidemica;

CH;

(a) Ora sono i principali punti sopra de quali sempre appoggia la loro opinione questi Medici, l'quali vogliono, che la Tosse Convulsiva abbia la sua sede primizia nello stomaco, il cui muco non è il muco stesso, che gli viene tolto con la spugna Tossica, ed è altro quello muco, che gli viene tolto con la spugna medicinale, che successivamente prima dissolvono, ed che è difficile a tollo, non senza il vomito empireico, ma

disperso, ed in grande luogo poi non è altrimenti morbida in natura, che gli viene tolto, e che produce gli emetici, perchè tirano a sé, cioè di più delle altre spingendosi gli umori della Tosse, ed sempre gli emetici partono, ed gli emetici muco, ed i purganti, e se del purgante si fa uso, la Tosse però riprende prima che cessi del Purganti usage, e del muco riprende alla stessa, ed alla stessa.

na; un principio dunque si ricerca infallibile, e molto semplice in alcuni sistemi e quello che vogliono produrre i morbilli; il quale per qualunque modo introdotto in una data popolazione, per che tutti quei periodicamente suscettibili dell'una o dell'altra regione, e che per una guisa particolare si attiene a quegli individui, che ora si trovano disposti a riceverne l'impressione, i quali ora sembrano appunto i suscettibili, non esclusi con le stesse predisposizioni ad altre persone (p).

Che poi la Tossia Corvulina sia manifestamente contagiosa basta l'osservare come essa s'intende, e si propaga rapidamente in que' luoghi maggiormente ora erano raccolti, e rimasero i suscettibili, e la tosse giuovane negli orfanotrofi, nelle scuole, nelle case di educazione, e nelle stesse particolari famiglie, attendendo l'una dopo l'altra quasi tutti gli individui, che in esse lasciati, si trovano disposti a riceverla.

Ne vedete poi, e poi volte comunicarsi la Tossia Corvulina Epidemica nei soli casi de' suscettibili colti dal male, e talvolta poi col solo bere nelle stesse bicchiere, coll'usare promiscuamente della stessa latte, e degli stessi utensili, che più la stessa tosse si accende di averlo ancora in una casa ove non c'era la Tossia Corvulina nelle quale entrò egli dopo di avere fatto molte visite a dei suscettibili che erano strettamente unitati dalla Tossia Corvulina.

Finalmente l'osservare che la Tossia Corvulina segue l'andare dell'altre malattie epidemiche contagiose, facendosi vedere insieme i morbilli, ed il vaiuolo ed ogni cinque, e sei

(p) Il contagio morbilloso e quello della Tossia Corvulina hanno di comune, che si dimostrano più o meno comuni agli ussati delle prigioni, per tutto il giro della stessa città, e in alcune, e vengono naturalmente i suscettibili, perche l'Epizootia della Tossia Corvulina e perche questi ussati, in presenza di una affezione di ogni l'una

dell'altre, dovei Malum per uno spazio di tempo in Tossia Corvulina, con l'azione propria, forse alcuni che, per una parte, l'azione di questa, per una parte, come il tempo, nel periodo della, la tosse più sospesa, di che la tosse della tosse, e la tosse della, non solo, come si spiega il Clark al caso del gatto.

anti, è un'altra prova, che la Tosse Convulsiva è veramente epidemica e contagiosa.

Chiamato il presente Articolo con due importanti riflessi politici; il primo de' quali si è che la Tosse Convulsiva può ritornare benissimo più di una volta ad attaccare lo stesso soggetto; e l'altro, che non la riguarda sì soggetti adulti, ed anche molto avanzati in età; e ciò singolarmente a certi giorni.

*Histary e Riassunto* fanno d'opinione, che la Tosse Convulsiva non volta certamente da un qualche soggetto non giuvenne la seconda volta; e lo stesso *Riassunto* afferma la stessa cosa, ma l'esperienza, almeno da molti anni a questa parte, mi fece conoscere, che la Tosse Convulsiva, successa il primo naturale, ed è mercolli più di una fiata ritornata ad attaccare la medesima persona; ed in questo il secondo riflesso, ella è così seria, che sembra quanto fiero mercolli più comunemente attacchi la stessa persona, da parecchi anni a questa parte però non la riguarda mai agli adulti, siccome poco sopra abbiamo indicato di volta, facendo però riflettere, che tra gli adulti, che vengono colpiti dalla Tosse Convulsiva, coloro ne sono i più propensi ad incurtarla, i quali sono forniti di una fibra, e complessione più molle, e debole, e facilmente irritabile.

Quindi ella è così di fatto che molte giovani donne paurose, preganti, e lettere vengono presentemente dalla Tosse Forte, o Convulsiva fortemente afflitta, e travagliata, ne ha perciò veduta, e riscontrata in pratica molte che travagliate da così fiero male, e dagli umori costanti dello stesso, abortiscono continuamente, o soffrono parti minaccie di aborto, emorragie uterine, e sanguinanti molli, ed altre poi costrette in stato di puerperio, rimangono languente, deboli, e travagliate dagli effetti della sempre molesta ed ostinata Tosse Convulsiva (a).

(a) la stessa parte: facoltà più 1 che gli adulti non solo continuamente

## CAPO III.

*La Toss. Convulsiva si associa facilmente a molte altre malattie Epidemiche.*

Arragabili la Toss. Convulsiva il più delle volte si è associata militarmente Epidemica in un gran numero di persone, pure la più estesa osservazione di gente e commercio, che essa talora si accompagna singolarmente ad alcune malattie ereticamentali, e di altre specie acute.

E per progredire secondo l'opere de' tempi, si discosterò nelle osservazioni pubblicate da diversi Medici de' nostri paesi che nella nostra Provincia nell'anno, per esempio, 1798, in sostanza, inferì un'eterosidica influenza di Fieberi Catarrhali conquistata istantaneamente dalla Toss. Convulsiva Epidemica violensissima, che durò per tutta l'estate dell'anno seguente 1799.

Nell'anno 1793 in primavera la Toss. Convulsiva comparve unita a quella particolare malattia, la quale ora si del Mantova, o Castione, o de' Cantoni comunemente si appella, la quale influenza malica si diffuse presto rapidamente per tutta la Lombardia.

Succede però questa malattia è particolarmente costituita da certa considerabile gonfiore, e durezza delle ghiandole parotidi, con tumefazione ancora della cellulosa delle parti laterali del collo, con risaltate notevoli delle fauci, quindi la Toss. Convulsiva, coi suoi violenti parossismi scottando su tutte queste parti della macchina contrainditi, arraghiava nell'inferno la più acuta, e violenta sensazione.

della Toss. Convulsiva, e si è, quindi associata appunto la Toss. Convulsiva Epidemica a certa isterica isterica, ereticica, o ereticale, e in altre specie, ed avendo talora di osservare per esempio:

quando non ad ogni un dato soggetto, quando non ad un individuo varrà una più o meno di durata, che di solito, che ancor non hanno indotto la stessa malattia.

Nell'anno poi che si primavera, e nella state, la *Tosa Corvuliva Epidemica* si manifesta analogamente, ed unita alla terribile malattia del *Fajardo naturale* con grave danno, e pericolo di coloro tutti, che si trovavano vicini, ed aggruppati dal conflitto di due egualmente forti, e gravi malarie. Nell'anno che la primavera compariva nella nostra popolazione i morbili, e questi congiunti in singolar maniera alla *Tosa Corvuliva*.

Negli anni 1803, e 1804 la *Tosa Corvuliva* si riconfermò congiunta alla *Falbia Epidemica* naturale corrispondente, che tra di noi regnarono analoghe affezioni e quella che abbiamo detta, che furono nell'anno appunto 1790.

Nella state dell'anno 1804 il *deliriosissimo* Melique Sigismundo Salotto di Celisima ebbe ad osservare una terribile inferenza di *Scarlatina*, e di *Rubeola* accompagnate colla *Tosa Corvuliva Epidemica*, e che perciò la condotta della stessa, aggravao molto, osservando che in tale occasione queste fere morbo non quasi sempre venno ad una forma propriamente *gottica*, e *paralo-verminosa manifestissima*.

Nell'anno 1807, trasiu questa stessa malattia miasmatica unita alla *Tosa Corvuliva* alla popolazione Città di Truxila, ed oltre, afflicto moltissimo le nostre popolazioni, osservando che la *Tosa Corvuliva* si cominciava a cedere con le *febbri Catarrali Epidemiche* che in alcuni regnarono simultaneamente, anzi nell'anno 1810 la *Tosa Corvuliva* fu osservata che si combinava con quasi tutti i morbili Epidemici, che in buon numero si erano diffusi per un esteso tratto di Provincia, e Regno, e ciò in modo così straordinario, ed universale, che venne rimarcato ancor da coloro, che erano si occupano nell'Arte Salutare.

Finalmente una nell'anno che la *Tosa Corvuliva* ritornò ad infestare le nostre popolazioni, associata finalmente ai *Morbili*, ai *Corroni*, alle *febbri Catarrali d'ogni maniera*, che in quella interposta annata aggraverissimo afflicto.

## CAPO IV.

*Distesi della Toss Contagiosa.*

Deve esser noto abbastanza, e dimostrato ai Saggi Medici, perchè basti indicarlo soltanto, che ogni e qualunque contagio agisce sulla macchina vivente in una maniera effetto irritativa, e che per ciò da per sé non aumenta, e dissolvensce, l'entrante eccitamento, ma soltanto lo disturba, e lo equilibra ne' varj organi, e sistemi, nullamente sembra fuor di dubbio, che tal volta la forma di alcune accidentali combinazioni, può la malattia contagiosa irritativa, essere accompagnata dalla Distesi Iperostica ovvero con Iperemia.

Come accidentali combinazioni, sono di due specie, e che operano insieme sulla stessa contagio standando, o dellittando, ovvero il contagio videremo si porta ad affettare individui di già o disposti, e attualmente possedendosi dell' uno, e dell' altra Distesi; giacchè le potenze irritative hanno la forza di sviluppare per una quella qualunque Distesi, in de cui predisposizione esistono in un dato soggetto ad un altro grado.

E siccome poi le formazioni, o la forte tendenza ad una delle Distesi può nascere nel corso del morbo contagioso irritativo, così non è nuova il vedere nel progresso di quella i fenomeni di aumentato, e dissolvente eccitamento, che rendono complicate e più grave la malattia.

Ques e ciò, il contagio una volta introdotto nell' organismo si converte ne' alcune fase clinica, per cui mirabilmente egli comincia di nuovo, annidando nella sua natura gran copia di nuovi animali; e perciò essere venendo la macchina a privarsi di una porzione de' suoi fluidi stimolanti ne' più avanzati periodi di una malattia contagiosa quando Iperostica, e vede che essa si va mano mano congiungendo in vera Iperemia.

Tutte ciò devonsi applicare alla Tosse Convulsiva; non essenzialmente, perchè prodotta da un contagio, è una malattia irritativa dell'area bronchiale; ma può essere tanto nel suo primo sviluppo, quanto nel suo progresso accompagnata da uno stato Iperstenico, ed Iperstenico.

Si converrà per altro, che la malattia di cui si tratta è per lo più fino dal suo primario ingresso Iperstenica, e ciò in prima principalmente della discesa ed almeno assai, e di frequente disturbata funzione della propulsione aerea, mentre la costituzione particolare dell'annuale stagione, in cui molto più, che in ogni'altra si sviluppa la Tosse Convulsiva, arrestando di più, che in questa anche, la Difesa Iperstenica si mantiene il più delle volte in tutto il decorso del male, perchè le ragioni stimolanti, che la producono, non cessano mai di leggeri in quella stagione, e perchè il processo fisico-chimico del contagio della Tosse Convulsiva nell'organismo animale non è di pari forza e rapidità d'azione dotata, come quello, che da molte altre circostanze specie di contagi si propaga, e specialmente del Tif.

Nella seconda però, quelle Tossie Fortes che attaccano soggetti deboli, e talvolta nelle stesse stagioni, e quelle che sono Ipersteniche nel loro principio, si accompagnano a malattia di debolezza, perchè in seguito agiscono delle potenze deprimenti, si osservano allora che divergono benistimo Ipersteniche.

I segni però, per quali si conoscono le differenti distinzioni sopravvenute nella Tossie Fortes, essendo generali e comuni ad ogni'altra sorta di malattie, non credo ora necessario di occupar con particolare minutissimo dettaglio.

## C A P O V.

*Cause generali che possono avere influito a rendere la Tosa Ferrina Consolare così frequente, e così complicata nell'epoca presente.*

Non posso dispenarmi da una nota, che può darvi molto interesse per ritrarre degli utili consigli profetici, onde allontanar possibilmente dall'anno di sanguinose nozze.

Molte malattie epidemiche contagiose, le quali secondarie a nostri progressi più remoti, si fanno scaturir dalle insospetite rinfrescanti piogge del nostro Biondo, e da altre parti ancora, porre, che con la loro lunga dimora nelle nostre infelici contrade, e nei nostri chiostri basti, si erano un tal poco ingrossite, e non erano facilmente ne' loro ordinari effetti.

In hoc pallio certamente, il rapido attuale, lo scurioso, il cattivo russo, e somiglianti molti, tranne alcuni casi singolari, si sono essi presentemente meno randali; all'appresso le Febbri Petecchiali, i morbilli, e finalmente la Tosa Consolare sembra che sieno morti e nostri giorni sempre più sani, e fermabili ne' suoi perniciosi sistemi.

Io però poco firmo spienza, che prescindendo da moltissime altre ragioni fore da noi poco conosciute, e destinate capaci di scuotere moltissima l'andamento regolare ne dell'una ne dell'altra tra le epidemiche malattie, tra le cause casuali della Tosa Consolare si debba ancorver la straordinaria costituzione de' tempi e delle stagioni.

Elle è con di fatto, e concordata abbinanza del Medici, e dei non Medici ancora, che da molto tempo a questa parte le stagioni tutte non conservano il loro ordine attuale; massime le tre stagioni estive che coll'ordinario calor solare infuocano il buon senso dei prodotti tutti della terra non solo, ma della generale salute degli uomini.



Mantene in quasi tutte le correnti annate que' gradi di calor libero permanente nella nostra atmosfera proprio della stagione nostra ben regolata, e tanto utile al nostro benessere; se sopraggiungono alcuni giorni di calore solare estivo, si tengon dentro ben tanto mollezza generale da precludere morosi spauri, e commozioni; e ciò che più fa al nostro proposito, con tale, e tanta alternazione nell'atmosfera per cui stabilita la trasparenza, si trovano i nostri corpi troppo empattamente deposti a subire una scossa di moli corrispondenti, e rimasti d'ogni maniera, non che la stessa Toss Epidemica Consuliva, di cui si tratta.

E gli inverni moderati di quel vero freddo asciutto, e sereno, che tanto serve a ridonare la conveniente energia ai nostri corpi, ed in quella vena ridondante da soverchia umidità atmosferica sopra noi sempre, e burrascosa; quanto mai così fatte stagioni non modificano e preservano tutta la sorta di moli di pectus acuti, e crepus d'ogni maniera, ed a disingannare la stessa Toss Consuliva Epidemica!

Le parti certamente del corpo animale vivente le più esposte a ricevere le maggiori imprime della nostra sempre variabile, e burrascosa atmosfera, sono i polli cutanei, e l'organo della respirazione, qual meraviglia può in, come se non decano, si vedano a giorni nostri ad invadere tanti e tanti moli di pectus d'ogni maniera con suoi come orribili, tante affezioni reumatiche venosissime, e finalmente la stessa Toss Epidemica Consuliva, in un modo il più ostro, il più arduo, e facile ad un infelice numero di persone?

Alle quali cause generali si dove aggiungere la poia, e notturna crepuscolare, che si ha di allontanare le persone ed i loro familiari colti dalla Toss Consuliva, da quelli che ne sono ancora muniti, non dequantando indifferente; come pure la stessa sempre più sparsa, e variabile temperatura generale degli anni nostri viventi; e la poia cuncta che si tiene della prima trasparenza de' nostri corpi dalla maggior parte delle persone, e dalla più tenera gioventù.

## CAPITOLO FL.

*Andamenti, durata, crisi, e degenerazioni della Tosse  
Convulsiva in altri mali.*

1. La Tosse Convulsiva Epidemica, qualora si sia in qualunque modo introdotta in una data popolazione, città, o provincia non si diparte, se non dopo un ben lungo giro di stagioni, e di annate variate; qualora si sia attaccata ad un qualche particolare individuo è solita costantemente durar venticinque almeno per quattro anni estivi, e lessa spesso fino per due o tre anni continui; e alle sempre in relazione diretta dell'età, del temperamento delle persone, e dell'indole stessa del malia predominante, e delle stagioni.

a. Oltre del passaggio ordinato, che si opera per la più rapida dell'esque della Tosse Convulsiva, l'indole stessa appunto delle sempre variate stagioni, e di certe peculiari circostanze concomitanti può molto influir a renderlo più celere, o esperto.

3. Se la Tosse Convulsiva si sviluppa epidemicamente in tempo d'inverno aspro, e crudo, e nello stesso punto successivamente umido, e burrascoso, è solita a continuare fino alla più avanzata primavera, se si manifesta in primavera colla sopravvenienza del calor estivo, si scioglie facilmente, se però lo stato, come per troppo addirittura, resta nascente di vero calore estivo, e sia agitata da frequenti burrasche, e tempeste autunnali, l'indole predominante della Tosse Convulsiva continua fino alla stessa autunno; nè si arresta, che col freddo invernale, qualche però egli sia regolare, ordinato, e sereno, convertendo in fine, che ben di raro si converta a sviluppare la Tosse Convulsiva epidemica in tempo della stessa, tranne alcuni casi particolari.

4. La Tosse Convulsiva, qualora sia sorta da febbre, e meno periodica, comparsa però con febbre, o congiunta coi morbilli o con altri mali acutissimi epidemici, diventa ordi-

ta pericolosa; se, segnando Fortino di così fusti morti, con esso si cinghesse, è cosa buona; altrimenti se continua dopo un tale periodo, si rende ostinatissima e giuoca all'Pannacotta.

5. Se nel tempo, in cui il fanciullo aveva l'ulcera è attaccato dalla Tosse Convulsiva, già si manifestano alla pelle, e la crassa letizia, o puscolo, ed altre impetigini, è cosa utile; all'opposto, se con tutte le cure non cessano all'impetuosa di concussione, e violenze, la Tosse Convulsiva diviene più terribile, e micidiale ne' suoi effetti.

6. La Tosse Convulsiva se porta per aggraverarsi insieme l'attorciglio della urina, quando questa non dà strabocchevole, non è da temersi; qualora poi passi dagli sbocchi di sangue dal petto, con grave apprensione di sangue, è molto pericolosa; meno perigliosa non è se il sangue discende dagli occhi, e dalle orecchie; nelle donne incinte, qualora sotto il conflitto della tosse esce il sangue dalla matrice, l'aborto è quasi sicuro.

7. Io non ho mai veduto a sopravvenire la rachitide in conseguenza della Tosse convulsiva, come pretende, che avverte il Sig. Azzo di Bastani, e molto meno le scrofole.

8. Minora la Tosse Convulsiva, se un dato soggetto, se rimane in una sua lenta febbricitante respirando con tosse cronica, e gli accessi si cinghesse in sanguigni, e paralizzanti, diviene agli ultimi vicini a giurare alla tale palmanale, alla concussione, al marasma.

9. Se detto alla Tosse Convulsiva, rimanga nell'infanzia una permanente maniera di respirare con perfenne considerabili alla faccia, ed alle estremità, come gran pericolo di passare alla leucodermia, alla cachexia, all'idropsi acide, all'idro-encefe ed a congestioni cronici secondo i terribili esiti.

10. Qualora gli accessi della Tosse Convulsiva siano troppo frequenti, e continui, senza tregua, e come poi, possa venire, come è avvenuto più volte, degli accessi di sangue nei vari cerebri con la conseguenza spopolata distensione talvolta mortale, o pure una spopolata permanente convulsiva.

ra, non ignota ai Medici Generalisti, ed altre dato per poco nascono delle delirazioni mistiche ne' vari vascioli, ed anteriori posti in vicinanza del cuore, quindi della dinocpi, e an- niglianti gravissimi morali malati.

11. Meno famosi sono gli effetti della Tossia Generalista, in questi si limitano ad apportare delle sole crisi ingrossate, uncinati, delle piodonanze dell'intestina retto, della vagu- na, la perdita della voce temporaria, e sentiglieri innomati meno pericolosi dei capi esantiali.

12. La Tossia Fecula, e Generalista nei bambini più teneri, non essendo il primo, e secondo anno della loro età è più al casi facile, che nei maggiormente avanzati, e molto me- no negli adulti che posse sono una maggiore resistenza alla vitioleni come, prodotta dalla Tossia Generalista agli equali tutti destinati alla respirazione.

13. I vomiti macosi trattano fino ai parossismi della Tos- sia Generalista, e queste sono quelli più frequenti ed abbon- danti, più solleciti durante il scioglimento, del parossismo, e della stessa malattia.

14. La Tossia Generalista è più tormentosa, e senza di maggiori incroci, qualora attacchi l'ammalato più la notte, che il giorno, più a stomaco pieno, che a digiuno.

15. I fruscii, che nascono da grossi tacci, o malafic- ci, arrivano sempre pericola maggiori di rimanere sotto del- la Tossia Generalista; e la stessa arriva qualora i fruscii sieno scopi di complessione ingrossata, e tal tali per que- lunque altra ragione.

16. Fino a tanto che l'accrete, che viene agitata dall' ammaliato, altra non è che una lampada fida, ed incoastante, il parossismo è più lungo, e più fiero; la segrete allora che l'inspettorazione è facile, copiosa, di essere bene aderente, e sciolto, i parossismi divergono gradualmente più brevi, e più miti; e la Tossia Generalista tende ad un lungo sciog- limento.

17. Se si giunga a tempo della prima ingrossata del mor-

to, facile con alla e, per quanto l'esperienza di documenti, coi bianchi purganti, e sopra tutte coi vomiti di sangue il corso alla sempre lunga, e molata malattia.

18. Quanto più però sono maggiori le funzioni del corpo, che risorgono alterate, tanto più grave è la malattia; il fasciello rifiuta momentaneamente il cibo, se, riscuote, continuamente lo aspetta; se non trova né posa, né sonno; se perde le sue forze, gli si gonfia la faccia, e gli occhi; respira con sforzo, perde la voce, non si muove, che a forza, è de temere che resti vittima del morbo, o che passi ad incontrare una crisi, e lenta malattia secondaria, che lo tragga alla morte.

19. Al contrario, se il fasciello continua a mantenersi, ed anzi dei restanti conflitti della Tosse Convulsiva, vegeto, robusto, vivace; se mangia, se dorme convenientemente, prova speranze, che superi felicemente la malattia.

20. Se la Tosse Convulsiva si trova associata a malattia più gravi di petto, o di basso ventre con loro piccolissimezza, il pericolo si raddoppia, e la malattia e subito in tali casi di avere un esito infelice.

21. Le adulte persone, le quali d'ordini giorni vanno per esse soggette alla Tosse Convulsiva, se danno di segni manifesti, fuori a robusti, soffrono meglio l'insulto della malattia, se per altro la persona adulta sia di temperamento languido, sensibile, sensibile, ovvero inclinata sopra tutto a mali di petto; in tutti questi casi, la Tosse Convulsiva è gravissima, e dispone il soggetto ad incontrare delle conseguenze mortali, che pongono a saggiare le forze difensive, e le precipitano in una serie di mali cronici di petto, e quasi irreparabili.

22. Le donne soffrono moltissimo, se vengono colte dalla Tosse Convulsiva; e tanto più se sono in stato di gravidanza, o di puerpera; le puerpere più soffrono meno delle incute.

23. Finalmente i miseri, e gli indigenti sono i più be-

negliati dalle vere Tasse Convalsiere epidemica, e ne soffrono i maggiori danni, in conseguenza della assoluta mancanza del meno tanto modesto, quanto costante, e profilattico, onde poterli al stato della maggior diffusione del morbo stesso, e da tutte quelle lesioni conseguenti, che è solito di recar seco singolarmente in quel fatto critico tutto di persone.

## P A R T E S E C O N D A .

### *Metodo di cura.*

*Typhos*, per mia avviso, è la cura spettante alla Tasse Convalsiere: chea è quella infatti, che si richiede per distruggere ne' soggetti, che ne vengono attaccati, cioè quella, non cui si cerca di render più rem, meno violenta, e più brevi gli accessi della Tasse Convalsiere; ed altra finalmente quella, che può darli profilattica, ancor la quale svilupparsi non vola la malattia in un dato soggetto, si cerca d'impedire, che il di lei contagio non si diffonda, e che perciò alla stessa non si propaghi rapidamente, e se è di già rem espulsa, se ne arresti possibilmente l'ulteriore progresso.

Ed in quanto alla prima specie di cura, si opera in primo luogo dover tutto alla salute, al vero aspetto, non più di prevenire la Tasse Convalsiere, la quale può più commodamente dividerli in tre stadij particolari, cioè in ingresso, cioè in aumento così attuale, ed in fine in successivo decremento, e conseguente se benigno ed se letale.

Oltre di che la Tasse, di cui parliamo, è in tutto il suo decenso o semplicemente irritativa, o irritativo-putrescente come più di frequente succede, o irritativo-putrescente; appare nel suo ingresso irritativo, nel suo aumento irritativo-putrescente, e nel suo decremento irritativo-putrescente; oltre fatto ancora può essere questa Tasse irritativo-putrescente, ed ipocritica nel suo principio; putrescente-putrescente ed ipocritica nel suo aumento, e nel suo fine.

Ona poi deve considerarsi, che la *Tosse Convulsiva* talvolta può essere semplice ed altre volte ancora complicarsi ad altri particolari morbosità, e ciò sia del suo principio; ovvero staccatamente comparir ne' suoi primordi; può in seguito combinarsi con altri morbi particolari.

Ona mi farà nel mio ragionamento a considerare la particolare cura che poi si conviene a caduca di queste accidenti forme di *Tosse Convulsiva*.

## C A P O I.

*Cura essenziale della Tosse Convulsiva semplice irritativa.*

Due sono le principali indicazioni, che si presentano da soddisfare al Medico curante per vincere questa specie di *Tosse Convulsiva-irritativa*, la prima è quella di capellare il contagio dall'organismo, che ne è affetto; e se ciò non si potesse agevolmente ottenere, si deve procurare di renderlo inutile, ed impedire l'ulteriore sua fermentazione, in avendo luogo di ostendere la sensibilità; e quindi togliere la di già indotta irritazione dell'area bronchiale.

Per ciò adunque che appartiene alla prima indicazione, non può aver luogo in tutti e ne gli stadii esistenti della presente malattia; e meno che non si volesse supporre come appena ancor le stesse selenose Cause, che il contagio, e l'infiammazione di molti altri, nel di lei ultimo stadio, per la durata del tempo, abbia prodotta la sua attività, e che perciò la *Tosse* si mantenga tuttavia sensibile ed attiva, per la sola abitudine, e per essere piuttosto degenerata in un altro sistema malare.

Ma nell'altro morbosità contagiosa universale la cosa non procede egualmente; poichè posto in circolo il contagio, si attacca, per così dire, ad ogni parte dell'organismo, e vi risiede in esso per ogni dove un processo analogo a quello da cui essa riparte il suo principale sviluppo; e può essere

qualche sostanza nota, che venisse bene sparsa uniformemente su tutti i tessuti dove si sopprimere la di già non universale infezione; ma che al più possa non rendere più acute, e meno pericolose il corso del male; ma nel primo periodo si può giungere tal volta coi rimedj antifebrili ed espellenti il cui finimento ad arrestare l'alterazione progressiva contemporanea nell'organo, e con ciò poco a trattare il rapido progresso del morbo predominante.

Il contagio stesso della Tosse Convulsiva sembra in ogni di lui stadio stazionario nelle sole vie aeree, ed ivi esercitare sulle ghiandole mucose l'ingeneramento la sua clinica azione; egli è quindi evidente che in ogni, e qualunque periodo del morbo, esso può essere attaccato dal genio espellente il contagio nel principio, ciò che sembra non essere lungo nella altre malattie contagiose.

Ad un tale oggetto perciò, il rimedio espellente in allucinazione e qualunque altro è certamente l'essenziale; egli influenza tanto per il vomito, che per la diarrea, quanto per la nausea, che induce va distaccando, ed espellendo il contagio primitivo marcato, fortemente agli organi inserimenti alla respirazione, ed alle criste subvelli, mediante l'espulsione sopita di quel moco, che, per effetto dello stesso contagio che vi si trova unito più abbondantemente si separa da queste parti.

Il vedere la stessa utilità di questo rimedio nel rendere più lenta il processo della rea Tosse Convulsiva, e nell'abbreviarne gli insulti, ha spinto a moltissimi riguardarli Franks, che l'essenziale ha quasi unico ingegnere specifico nella cura di questa particolare morbo.

Sarebbe cosa troppo lunga, e tediosa se tutti ad uno ad uno annoverare le volte gli Scrittori, che nella cura della Tosse Convulsiva, posse in opere gli stessi in varj modi, e maniere praticati.

Leggiamo negli *Atti della Reale Accademia di Parigi per l'anno 1743* i vantaggi osservati nella cura della Tosse Convulsiva operati in moltissime Quarantene istituite in tale



aggravanti; ed il celebre Medico poi il Sig. Boissacille, presidente di cui erar mai adoperata altra rimedio, per ottener la liberata guarigione del torto indicato malore, se non se l'antico bene mangiato, e lo stesso asserisce il Sig. Nover, nelle sue *Observations* stampate a Parigi l'anno 1722.

In Inghilterra poi, dove questo fiero malore fiero invadea stupe, ricorreva presto il Sig. Boon de Boerstein, dell'anno 1742 fino all'anno 1764, nel qual tempo morivano dalla stessa malore quantunquattro mila trecento e novantotto fanciulli, cioè due mila settantotto dall'età per anni, in quel Regno, in due fu spaventosamente uccisione l'uso degli emetici, sopra ogni altro rimedio; e Göttinge parimenti Brandel lo adopera non molto successo.

In Inghilterra i Medici più riputati lo posero in opera, per fine lo stesso Spedimento, cioè il *Melior*, *Walsburg*, *Monrope*, *Kreß*, *Loeffler*, *Fothergill*, *Callan*.

Molte varietà però si dimostrano presso i commentatori Scrittori sulla scelta del rimedio medicinale, tanto rapporto alla maniera di prestarlo, quanto per le dosi, per momenti, e per le circostanze, in cui somministrarlo.

E per verità non può potersi in opera l'emetica, senza prima premettere il salasso; anzi non valere che si usasse di quel fatto rimedio nel crude inferno, ma solo consigliarsi nella molto stagione, e nella vita; dunque, *Fothergill*, *Callan* preferiscono ad ogni altro emetico, il Tartaro emetico, somministrato in due atti e procurare il vomito, *Monrope*, *Kreß*, *Boerstein*, e moltissimi altri ripetono più volte l'apomomachia.

Il primo di questi Autori la suggerisce in continuo e picciolissima, e s'istita due, otto soltanto nel ridurre la vomita; il secondo la cui vorrebbe che la si usasse soltanto in infanzia, ed il terzo ne consiglia l'uso in continua ed in due, da procurare il vomito, secondo all'attuale squilibrio allungato con l'acqua destillata.

Per quanto però siano variati le opinioni dei commentatori

torati Medici, ed altri Autori nella più conveniente maniera di praticar l'emetico, se possa farne opinione, che non si sia circostanza veruna, nè di età, nè di sesso, nè di stagione, che possa escludere la convenienza dell'emetico manovratissimo maneggiato dal Clinico ben istruito, e sapiente osservatore, e sopra tutto se venghi praticato nel primo stadio della Tosse Convulsiva, quando non è più spaziale, che il contagio sia ancora quasi asperso, e palleggiante nell'area bronchiale, e nelle fibre, e che per ciò possa essere più di leggeri espulso dalla energia forza del rimedio.

Eaches per me adunque agi' altre cure di emolliente sostanza, condotte da ben lungo spazioso, stabilito fermamente, che la sola *Radice di Ipocistone* potervano, e data in sostanza, è da preferirsi a qualunque altra emetica.

La dose però di un tale rimedio per me viene in tal modo proporzionato, che lasciata dell'età da un anno fino ai dieci, comincia, generalmente parlando, la dose di tre a sei grani d'ipocistone per ogni presa, da se non si sia si può aumentare la dose fino quasi al doppio all'ogni presa, sempre però gradatamente progredendo ed avendo in vista le buone o cattive del temperamenti nei singoli individui, dell'età, della effluenza, dell'indole, della stagione, e dell'epoca stessa in cui si comincia la malattia.

E per ciò poi che riguarda la continuazione, e le regole del rimedio, queste si possono dipendere dall'osservazione del più, e meno pronto effetto salutari, che se videremo all'annullato posto sotto l'uso dell'emetico stesso.

Si avrà una idea sicura che il rimedio sia benefico, e giovevole quando si osservi che l'annullato dopo alcune prese del rimedio vada migliorando nei conflitti occasionali della Tosse Convulsiva, ne quali si rendono più rari, e meno fieri, e violenti, e che poi con maggior facilità vada separando quella massa di mucosa materia tossica, che nella tosse spaziale tanto lo turba; e che finalmente le stesse rianagli a poco a poco, sollevate dal vomito disconvulso, o dai vomiti al vomere.

Non si devono escludere dalla somministrazione del rimedio, di cui parliamo, le stesse donne incinte, che sono aggraviatissime colte dalla Tozza Corrucciata Epidemica, mentre dall'uso dell'antico costantemente istituito, non ho mai veduto ed inseguro alcun funesto accidente, anzi ne vidi a chiarire un ottuso effetto quasi ed istantaneamente in ogni caso (a).

Alla stessa scopo però di promuovere la più pronta e spedita possibile dell'introdotta contagia insieme con quella maniera che se ne stava impiegata, non si devono omettere tra le precauzioni, ed estende subito dopo l'uso degli *antich*, i cui dotti espressioni, aggiungendo in questa prima specie di Tozza Ferrea principalmente quella, l'assenza de' quali nell'antichale costantemente non sta dalla massima efficacia onde poi per cui non si arde a rimpicciarsi una ciotola, che rendibile più espone la stessa malattia.

Tra gli espressioni merita un distinto luogo quella costante che indicano un certo tal qual grado di natura permanente, al qual effetto l'esperienza ed documentò, che sono indicati gli *antichali*, e specialmente il *Kerner Mischale*, e soltanto a tal tempo un stato molto celebrato da Glauco la pelle d'antichale, pure come sopprimere riflette Cullen, l'incertezza della sua dottrina che egli sia un rimedio meno adatto del *Kerner Mischale*.

Oltre poi al *misericord*, altri farmaci espressioni fanno, e sono celebrati in questa malattia, ed ecco con molta ragione.

Strandberg se bene prescrive con molta vantaggio nella cura della Tozza Corrucciata, l'assenza di Tozza e pochi gradi, l'antichale militare, la prima assunzione; e le stesse *Brendel* a Göttinga si servi del medesimo rimedio con massimo effetto in un'Epidemia di Tozza Corrucciata ancora l'anno 1747.

(a) Non si è spero, che il *Brendel* sia in errore, impiegando a questo uso gli *antichali* della sua dell'antico.

nella Tozza Corrucciata, e che presso il rimedio di de la *Tozza* prescrive l'antichale *Brendel* l'anno 1747.

La stessa *Marchia*, presso gli *americi*, e l'uso del balsamo in caso di piaghe, somministrava la gomma ammoniacca usata in una tintura di mille piedi.

In una influenza virulenta di *Toss Convulsiva Epidemica* che contagiava ardentemente l'anno 1717 nel Ducato di *Marchenburgo*, osservata, e descritta dal *Caldon Gellor*, presso gli *americi*, ed anche i disordini purpurati, venne a capo di domare il fiero male predominante, facendo prendere a' suoi ammalati prima delle emulsioni di semi di castagna, di cardo mariano, di papavero con la aggiunta di buona dose di gomma arabica, Resina di Balsamo, e finalmente col dar loro della gomma ammoniacca, con il Balsamo di mirra annesso, il vino orientale, e somministrati rimedi.

Il *Nriphor* fece medesimo in tal casi la gomma presero in una sua *Disertazione* pubblicata l'anno 1791 intitolata un *De Toss Convulsiva Lepthiana*. La stessa *dele* narra la predica come valde espectorante, lo sviluppo di *fulgure*, la rinova stessa delle contrarie, il capo medicinale, e somministrati rimedi furono pure a tale oggetto praticati.

Per tutti questi diversi parti l'esperienza mi fece conoscere, che rispondo più confacente, ed efficace, la gomma ammoniacca, il capo medicinale, la quella in sostanza, ed in forma di annesso tanto al gualtito di poma, ed anche a quello di *fulgure*.

Contemporaneamente poi all'uso di così fatti rimedi si devono praticare le salutari infusioni di fiori di carubo, di levillio, delle foglie di edera recovute di tassialgine, di pulmonaria, &c.

Finalmente se nel caso gonente medesimo nella cura della *Toss Convulsiva*, occorre un valde moderato, ed espectorante del seguente semplicissimo, e quasi domestico maschio.

Consiste questo nella polpa delle cipolla calzare ammacerata prima al fuoco, ed al fuoco; così passata la polpa per straccio si mescola con egual dose di mele del più perfetto, e si somministra a qualunque età, e più volte al

la gomma, ed è inefficace, quanto mi abbia corrisposto un tale insensibilizzante rimedio.

Per soddisfare poi alla seconda parte di questa prima indagine, per rendere cioè ancora probabilmente la lotta del contagio, ed impedire gli ulteriori suoi Funco-Chlorici effetti, e la sua riproduzione nell'organismo, sembra che al presente valga molto commendare del Michel l'uso dell'*Atropa bella donna*, e del *saffore di Potere*, e di *iodo*, questi farmaci furono da me riscontrati permanenti in pratica molto utile tanto nel primo stadio della Toxè Convulsiva come chiaramente agli ospedali, ed agli ospizii, quanto nel secondo stadio, qualora fossero fructi di poca efficacia i sopra indicati rimedi.

Il Sig. Hoffmann fa il primo che pubblicò gli effetti prodigiosi che fanno da me ottenuti nella cura della Toxè Convulsiva col mezzo dell'*Atropa bella donna*.

Egli l'amministra ai bambini dai 3 ai 6 anni alla dose di un quarto di grano mattina, e sera, alle volte però aumentato un tal poco la dose tre volte indente, e lo ripete più di avanti.

Wateler, dopo dell'Hoffmann perenne a usare in non pochi giorni parecchi bambini da due settimane attaccati dalla Toxè Putida.

Il suo metodo di praticar la *Atropa bella donna* è il seguente; poi bambini maggiori di un anno la dose è ancora da lui, da un quarto di grano aumentato a no grani di qualche; si poi teneri meno quarto di grano, per quelli più di 2 se tre anni se ne impiega un grano intero in due dosi la 24 ore, ed un grano più e meno per quelli che sono di quattro, o sei anni, per quelli si poi gradatamente accrescere poco la dose ogni tre, o quattro giorni di un qualche meno grano, quasi due si diminuiscono, si riducono, si modificano del saggio Medico, e norma dei buoni effetti, che ne vale per avanzare a derivare se non cessare.

Questa maniera però di Wateler di somministrare l'a-

idetto rimedio e per quella di cui io mi servo con buonissimo effetto, avvertendo per altro che se sotto l'uso del rimedio si scorgesse che il fanciullo si fermasse nella bocca notabilmente, e promette degli scorgimenti alle fecce, ed allo stomaco, si deve tutto disastuar nella dose, perchè è chiaro in allora che la difficile costanza del soggetto basta di troppo l'azione del rimedio.

In questo poi al soffice di potassa, e di soda non si viene proposto in una Memoria di Autore anonimo, che entra in concorrenza pel Programma proposto, e decretato da Napoleone nell'anno 1807 che venne data nella natura, proprietà, e scoperta del *Chape*, la qual memoria in prima appunto di questo rimedio fece l'attenzione della commissione incaricata ad esaminare le Dissertazioni in tal proposito presentate.

La sua dose è di sei a dieci grani uniti a quantità sufficiente di miele nella mattina, ed in minor dose, la sera, questa dose si anderà mano mano diminuendo a misura, che si va mitigando il male stesso.

Si può somministrare con vino, sempre però insalato nel miele, e disciolto nel latte, e nell'acqua, ed ancor si può prendere in bolli e pisco.

Subito preso il rimedio si sente un ardore nella stomaco, e le labbra divengono bianche, spesso dietro la prima dose nascono dei vomiti di macie finto di un color verdastro cinnabarrino, e così dello stesso rimedio, se ne può continuare l'uso fin al terzo stadio della malattia insensatamente, e con evidente vantaggio.

Degli altri vomitativi decretati specificati sotto la Torre di Poma, e Carrubena, di cui ora si occupano, non ne faremo che un semplice cenno, tanto più che tra di noi non furono bastantemente riconosciuti, e sperimentati.

Un certo Marx propone la glicina quando persiste una alla dose di una dramma per volta; Ratter nella medesima l'estratto di riccio; Ray, Gerard, Wilder, e Foss-Win-

col, di *Muscar paradisiacus*, Chalmers, Porter, Lettison, Schiefel, le specie di catteridi il loro palatore lo propaga da Lanno, da Pablin, Waiden; il *Didona libanensis* da Porter, Weber, van-Hoel, l'astore di nuovo prende natura, del *Prunus*, (a) che propone una il suo induttore potentissimo relesse; Gower adaperà molto le nazioni, Rodella il refuso oramai; finalmente Rora de Ransson propone la purgazione di stoffe marie (Ficoa vivale); un loro ballare ora' vuole in una libbra da latte per un quarto d'ora, e ne deve una emolliente mattina e sera si sanabile, dei sei si debba fare.

La seconda indicazione, che si deve avere presente del Medico curante nella Toza Gerodica; indicava, sempre abbiamo detto che deve consistere nell'attendere l'aspettazione sanabile delle parti affette dal morbo, e quindi tagliare l'irritazione dell'arco bronchiale affetto dal contagio già ricevuto.

Ad ottenere un così fatto desideratissimo effetto viene generalmente lo Medico proposto l'uso dell'oppio, e della emulsione con preparazioni un lussure ed eccitante poche ritenute per essere di brevità.

*Dewarby* ne propone l'uso in sostanza molto alle guance assapate, ed allo cavare in due diavole, e proporzionalmente, *Rue* lo propone non pure in sostanza ed in due infusate; *Ryding* lo vuole unitamente combinato coll' *Elix* pettorale di diavole; il *La fure*, e tutti altri si dimostrano analoghi ed in un così fatto rimedio.

Io però con buona pace de tanti professori Antici, Corri dico, che abbiamo l'oppio per la grande sua proprietà narcotica può avere utilmente proficua, pure avendo osservato in prima, che questo rimedio sopprime in gran parte quella tanto benedetta separazione per l'aspettazione di quella

---

(a) Porter, da proposta del Rorion Ficoa 1776.

transfusione fatta nella *Tron Carvalhira*, quindi singolarmente nei primi stadi di questa eruzione cutanea, fa quasi sempre da me cadere in tale remedio, e almeno certamente, e parzialmente adeguato (4).

Nel progresso però della malattia, allora quando già evidenti le già giunte al terzo suo stadio, in cui si cominciano a spiccare anche le stesse *Sig. Cutanea*, che entrano nel concetto il contagio; se la *Tron Carvalhira* tuttavia isolata in quasi soltanto dell'abitazione, e che non vi sia più grave aumento di sintomi aspettantabili, l'acqua, e la sua preparazione tornano molto giovevoli opportunamente somministrata.

Il *Catere* però, avvegnente tolto dal *Morbo*, e *Pain fetido*, allorché raccomandata dal *Sig. Miller*, non rimedi che risultano troppo nocivi, e di minor efficacia delle preparazioni tratte dall'acqua.

L'aspirazione de' vapori esalanti dalle decantazioni di piante emmenagogue, come sarebbero del *Jas*, e della *figlia di melon*, e della radice di *altea* ed altre simili, non devono essere tentate, specialmente se dalle violenti azioni della *Tron*, le fecce, ed i bruchi costanti avessero un senso molto di dolore, e di bruciare, e vi fosse una congiunzione le mucosità, e l'infiam.

Ecco poi abitualmente i rimedii che nelle cure della *Tron Carvalhira* si sono rivolti a nostri giorni del metodo proposto dal *Sig. Anthonvilli*.

Questo consiste in un balsamo formato di grasso, e di resina castorea, col quale si fanno delle flogagioni alla parte superiore del petto, e si ispirano fino a tanto che spunta sulla pelle una serie di piccolissime pustole rose, ed appassite, le quali pervengono più o meno lo stadio della pustola rosacea.

(4) Ma non giova partire in tale momento della malattia carvalhira con uno di purganti, singolarmente, e di purgare fortiori, necessariamente ripudi

di mettere la malattia della parte superiore in quel primo stadio dell'azione esclusiva del contagio.





della patologia conclamata della malattia stammi determinata più precisamente al polmone, ed al cervello, per cui ammettiamo bene spesso le polmoniti, cerebral, le apoplezie sanguigne, l'epistassi, ed altri simili pericoli conseguenti, quindi la flebotomia deve esser il primo luogo nella cura di consigliarli Tom Periss; perchè queste fatali minacce agli organi più interessanti la vita, richiedono che prima di ogni altra cosa, il Medico drighi i suoi sforzi, ed i suoi mezzi pronti ad un tal fin.

Oltre della giacobina operante, che se di ciò si ammette, un tal metodo di cura viene pure proposto dal sommo patista Salsomus, e Stahl, l'ultimo del quali con si esprime in tal proposito un *Sanguinem mittere oportet quater pulvis muner collato sanguine turpet, e Lotum pedumali parato da della flebotomia nella cura della Toux Consuetudina tal si esprime un *In principio stimulum, acriter ad prout*.*

E per sapere precisamente i segnali per quali occorre di doverne alle depletioni sanguigne nella cura della Toux Periss di cui si occupiamo; questa si deducano dalla accresciuta energia convulsiva dell'animalità; se si quartiti di opposizione di petto; se si trovi aggravato da debile con polso teso, forte, ripieno; se abbia gli occhi infiammati, i nasi pupillari turgidi e rigati; se, qualora viene colto dagli insulti della Toux Periss, diviene comunemente subitaneamente, e turgido nella faccia, nel collo, e talvolta per fine livido con affusioni di sangue, o dalla bocca, o dal petto, con calore unito di tutta la persona.

E ciò tutto più ancora, se il fanciullo, o l'adulto fosse di temperamento sanguigno, di età non affatto infantile; se la stagione fosse piuttosto fredda ovvero aspra, e rigida stuccevolmente, che a perturbare gradualmente la persona traspirazione de' corpi.

La quantità di sangue però devonsi essere sempre saggiamente regolata, e per la quantità, e per il luogo, e per il modo, e secondo dell'età del soggetti, della tolleranza loro, e della gravità dei già indicati, e conseguenti fenomeni.

Qualora poi bambini potessero bastare i salassi di una o due once, ed essi di raro rigettati, negli adulti se il fenomeno stesso moderato può convenire una qualche fitta soltanto una discretissima cordata di sangue; al contrario se questi, se si rimarchi qualche minaccia d'arresto sanguigno al cervello, e se tema di suffocazione, assegnabili se fossero angustie della depletion di sangue generali, se trasi molto profitto in tali casi dall'apertura delle vene jugulari.

Che se poi negli adulti si trattasse d'individui soggetti all'epilessia essenzialmente soppressa; in tal caso le angustie ai vari stadii riescono di molto allentamento nella cura della Tassa ossia Cerebrale, di cui si tratta.

Seguita la commovente laborazione, si deve ricorrere all'uso dei purganti non drastici, ma lassativi, i quali sono in tali casi utilissimi, e per il potere depurante, che esercitano, e per la evacuazione, che premorrono e tanto più si rendono necessarie, qualora si manifestasse l'esistenza di una qualche suborale natura stabilmente nella prima via dell'intestino, non che nei fanciulli meno usati nel loro regime dietetico, finalmente si evolvano; mentre la quale interruzione, non s'ha dubbio, l'intentamento.

Tra questi purghi distinguiamo i blandi e soprattutto quelli della castoreo, della manna, dello scilippo di fiori di porro, di cicuta con reubarbaro; ed ora per le prime moderate dell'età di mezzo, ed altre fitta ancora, qualora si sentono specialmente la complicazione verminosa e percolare, alcuni guaiacoli di mercurio della abilitate ad una presa di mercurio ed a qualche opportuna cura.

Vengono ancora commendati nella cura della Tassa Cerebrale, complice ipostenica, i pediluvj singolarmente campane, ed avvolgiti coll'aceto, onde deprimere possibilmente il sistema degli organi arrestati nella parte superiore, e de-terminarli alle inferiori, finalmente le stesse commoventi di tutto il corpo in bagno d'acqua tiepida ripetutamente praticate, se non sono primary causes nella cura dell'aneddotto.

tema, riscuote almeno molte giovarelli per la loro squallida natura rilascente, che esercitano su tutto l'organismo; al qual oggetto un tal poco debilitata nella cura di costata varietà di cosa, penso convenga la lavanda diaforetica ed antidiarrea, come sarebbero le infusioni reflenti di fiori di samburo, le decuzioni di rosa con il miele, gli acidi dilati, ed addolciti con il zucchero, o con qualche julebbe, o corda.

Adempita così la prima indicazione nella cura delle tosse violentate si passerà tutto ad impiegare quei mezzi curativi, che abbisognano a suo luogo bastantemente indicati ed esposti, siccome atti a soddisfare alle due proposte indicazioni della Toss. Furta semplicemente irritativa.

*Cura della Toss. Convulsiva semplice irritativa ipostatica.*

La Toss. Convulsiva può essere ipostatica fino dalla sua prima irruzione in un dato soggetto, o diventar tale nel progresso; dopo di esser stata prima di genio irritativo spaziale.

Una tale mutazione però può succedere, o per alcune individuali condizioni de' soggetti suscettati; o per la troppo attività di un regime debilitante costantemente adoperato per vincere il precedente eccessivo eccitamento. Si manifesta più d'ordinario fino dal suo primo sviluppo spontaneo nei soggetti d'ordinamento linfatico, e come li chiamo qualche moderno Medico, sistemi sensibili; e nei soggetti attivi in cui accade che dominasse epistemicamente la Toss. Convulsiva.

Ella si farà però riconoscere coll'assomigliare moltissimo alla tosse naturale anzi che no, dai suoi insulti non molto gravi, e frequenti; dalla respirazione meno penosa, e soffocante; dalla maggior copia di muco naturale materia che venga separata dallo stesso infreno senza alcun getto di sangue, e senza febbre, e dal presentarsi esso suo stato di debilitamento con polsi deboli, e qualche giacitura anomala.

affettuosità, ed altre analoghe circostanze. In tal caso conviene astenersi da qualunque durezza singolare, e da altre asprezze debilitanti qualche tempo, ed intanto che sia.

Ben inteso però che nei primi giorni di una così fatta cura si devono non omettere i mezzi da cui effetti nella cura della Tosse Concreta sempre derivano, ma però non tutta l'ancoratura, e la purgazione, singolarmente poi drastici purganti, e gli emetici troppo violenti, e continuati.

Siccome però singhieri rimedj, che non si possono unicamente tradurre sotto nella cura della Tosse Concreta spontanea, sono per la maggior parte forniti di un'azione ben sì aspra, ma pur pure debilitante; perciò onde togliere, o prevenire gli effetti nocivi, che da tali rimedj risulteranno potremmo, è necessario anche per tutta il corso della loro amministrazione la somministrare specie di cura da porre in uso i più opportuni rimedj.

La cougha però, che è ancor dotata di una forza sopprimente, e la cougha parossica data singolarmente in dose, sono, e non spontanea, i più proficui stimolanti da adoperarsi costantemente ad una cura riflessiva ed all'uso di succhi del vino.

Il muschio però, avvegnachè molto lodato non mi corrisponde mai con buon successo; i Medici singolarmente Inghesi lo valutano alle stelle nella cura della Tosse Concreta.

I partigiani di questo rimedio, tra gli altri come li Signori Fallo, il quale nella sua *Farmacopoea contemporanea* ci dà una ricetta da non creduta generalissima, recita: *si prendan 30 once di jalappa di maridie secondo la Farmacopoea di Londra, e se ne fa una piccola cantidad all'annullare nella ore di quiete.*

Il Sig. Martensen relata di buon grado l'uso del muschio con la Ghisa-Ghisa; lo suggeriscono ancora i Signori *Antoni Art. Soc. M. Nat. Vol. 1, n. 24 Austen in Notizen der Heilkund 1, n. 10 Gomer. Beobachtungen, 1, n. 20. Rami, in Art. Soc. Med. Bern. 1, p. 511.*

Non sono finalmente da negligerli tutte le applicazioni esterne di alcuni appropriati stimoli, specialmente alla regione dello stomaco, se sopra gli altri rimedi si trovano caso di longobilità, o se a tal scopo utilizzati per uno arrivo, i caratteri confluenti, ed in altro qualunque modo corroboranti, e così pure il lenimento refrigerante, e la milia del pane interposta negli spiritosi liquori.

Dopo di avere esteso il piano di cura che per noi si crede più conveniente nel trattamento della Tosse Convulsiva essenzialmente ipostenica, aggiungeremo ora, che se la Tosse Ferina si fosse da prima fatta conoscere sotto la forma di tosse ipostenica, e nel progresso del male si fosse cangiata in una contraria forma, per quelle ragioni che abbiamo poco sopra indicate, in tale caso non infrequente, si dovrà modificare la cura sulle stesse norme da noi espresse per combattere la tosse essenzialmente ipostenica.

Il qui in fine accennato avvertire che la stessa Tosse ipostenica può talvolta divenire ipostenica in molti, e molti soggetti, dovendo si venne fatta di cessare la perfina, quindi ciò avvenendo si deve abbandonare il regime stimolante, e ricorrere di bel nuovo al debilitante, oppure, se tutta l'ipostenia, la malattia rimanesse semplicemente irritativa, conviene allora allontanarsi da qualsiasi stimolo, e stabilire solamente, ed a seconda dei periodi del male, la dose indicativa della Toss Ferina irritativa, sempre però accompagnando la cura con la più saggia, ed attenta osservazione, onde evitare ogni eccesso, e dirigere il trattamento di questa sempre eristica, ed ostinata malattia, a seconda delle circostanze locali, sotto delle quali per troppo si fa volare al saggio clinico ragioniere.

*Cure della Tosse Convulsiva complicata ad altri morbi,  
e di quelle malattie, che simultaneamente vengono  
prodotta da essi.*

I malati di quali più di sorta si suole la Tosse Convulsiva si possono distinguere in quelli, i quali quasi accidentalmente si trovano affetti alla stessa, ed in quelli altri, che ne sono quasi una conseguenza, e che perciò si possono stabilire come *secondary*, e sintomatici.

Le malattie non pertanto alle quali più di frequente si unisce accidentalmente la Tosse Convulsiva, sono le seguenti.

1. La *Rachite*; 2. la *Scorbutica*; 3. il *Fascio naturale*, ovvero anzi talvolta il *Fascio*; 4. il *Cancro*, 5. l'*Angina peritonsillare*; 6. il *Contrattura*; 7. la *Pericardite*; 8. il *Rinorrea*; 9. la *Crota latente*, ed altre *impetigini* nel bambino; 10. la *Febbre intermittente*.

La seconda più, ovvero sistematica sono singolarmente, 1. l'*Angina tracheale*; 2. l'*Angina tonsillare*; 3. la *Pericardite*, 4. l'*Ostitide*, spesso fiera, ed acuta; 5. l'*Emfisema*; 6. l'*Epilessia*; 7. la *Chorrea* di vario genere, ma più di sorta l'*Epilessia*; 8. gli *Infermentati* di alcuni viceri abdominali, e singolarmente l'*Enterite* della ghiandola mesenterica; 9. il *Morbo*, la *Febbre Ebraica*, 10. l'*Altera*; 11. qualche *interna Americano*.

Coteste malattie secondarie però hanno bene spesso degli altri morbi ed esse particolari, e che costituiscono altrettanti morbi; i quali, perchè restano, ecco vieta la Tosse Convulsiva, vengono chiamati col nome di *religiosi morbi* della medesima Tosse.

Partanto si curava, poter rimover l'*Emfisema* del torace, e frequenti accessi di tosse prodotta, allorchè questa fosse dopo un qualche tempo interamente scomparsa; privarli si vede bene spesso ancora la *Tisi* in grado dell'*antecedente Emfisema*, e della *Pericardite* soppressa, così di questa,

degli infarctimenti edematosi, e degli interni emorragici le *Abraga* di varie specie, e sopra tutte l'*Idra Terrea*, e l'*Asiatica*; da una tal cura pur anche gli *Asphena*, delle gravissime affezioni mollioranti molti luoghi di natura diversa, negli aspi; finalmente il marasma dell'estensione de' vasci del basso ventre e particolarmente delle ghiande del mesenterio.

Quanto alla cura di quelle *Tossi Ferice*, che accidentalmente sono complicate ad altri morbi, la arde inutile di dire qui un dettaglio di esse, ch'esser deve relativa ad ogni caso particolare; giacchè i medici, che ben conoscono le circostanze la più appropriata a qualunque delle accennate malattie, colle quali può congiungersi la *Tosse Gonorrhoica*, sanno perciò usare quali altri ajuti a quelle corrispondenti del caso mettere in opera, cioè a quelli, che fissano convenientemente la stessa *Tosse*, onde insieme con questa combattuta, avvertendo per altro, che se la malattia complicate richiedesse dei soccorsi d'*Asiatica* opposta a quella dei rimedj appropriati per la *Tosse Gonorrhoica*, si deve in questo caso scrupolosamente calcolare i gradi d'importanza, e di pericolo di caduca di esse, e alla più grave dirigere la cura principale; rimediandosi, dopo che questa è già vinta, e divenuta di poca entità, di somministrare i relativi ajuti a quella, che fin allora venne necessariamente trascurata.

Ritene due parimenti della cura di queste *Tossi Ferice* a cui s'aggiungano, quali loro sintomi delle altre malattie secondarie, volendo così per queste quelle poche riflessioni, che fin se non relativamente alla cura delle *Tossi Gonorrhoiche* casualmente congiunte ad altre mali, solo mi basterà di ricordare, che ancora ben di sovente queste malattie, per le distinzioni delle *Tossi Gonorrhoiche*, hanno quando la stessa violenza indole di esse; ne avviene perciò che molto spesso si richiedano per domarle, dei rimedj della stessa specie, almeno d'un moderato grado di quelle, che si convergono al particolare uso della *Tosse Gonorrhoica*.



*Cure sistematiche sportive e naturali assidue  
della Toxæ Convulsiva.*

Con questa tripla io intendo di esporre alcuni provvedimenti, che utilissime si possono adoperare per rendere meno violenti, e meno frequenti, e più brevi gli accessi della Toxæ Convulsiva.

Mi venne fatto non pertanto più, e più volte d'osservare l'attacco della Toxæ Convulsiva già più vicino ad insorgere su qualche particolare soggetto, facendole nascer dal luogo ove si trovava, facendole passeggiare, dandogli a bere dell'acqua fresca e piccola porzioni trenta once di molto soffiate lo scuoteva dolcemente l'ammalato, il flagello della flagellazione allo archiccolo del cuore con olio di mandorle dolci amalgamato con qualche grana di Allani volatile, con olio di anacardo, e con altre analoghe sostanze.

Ci era ancora che si facevano fare all'infirmità delle immersioni nell'acqua tiepida delle temperature inferiori, ed anche delle sole mani, cosa che resa molto soffrire nei più gagliardi accessi della Toxæ Ferax, e singolarmente ove vi sia congiunta una forte mancanza di respirazione.

Non sono ancora da trascurarsi le applicazioni alle natiche dell'olio rosato, dello spirito di rose, dell'aceto vitriolico, usando però tutta la necessaria cautela nell'adoperare col loro aiuti, finalmente le stesse precauzioni solum può riuscirne necessarie talvolta, ed utilissime, di qualunque distesa sia la Toxæ, allora quando l'infirmità nei momenti stessi del più feroce conflitto della Toxæ Convulsiva sia attaccata e da qualunque cosa di sangue, e da qualunque sostanza di vena, e da qualunque gravosa intossica.

## CAPO III.

*Cura Profilattica.*

In quanto alla cura profilattica, si deve in primo luogo attentamente osservare, che posto un privilegio contagioso qual siasi esistente, ed emanando dalla *Tosse Generale Epidemica*, la prima cosa che si deve avere è veramente quella di allontanare gli individui sani, dagli attaccati dal malia presente.

Già conviene fare al primo sentore che la stessa *Tosse* si fosse manifestata in alcuni individui, o dappoiamente poi in un qualche famiglia raccolta in qualche luogo, o di scuola o di educazione, ed altro che fosse, con vinco ordinato metodico, e numerosi molti di similissimi individui naturalmente: per predisporre e ricevere l'impressione del mortale sopraggiunto contagio.

Senza questa universalissima precauzione profilattica la malattia si diffonderebbe con incredibile velocità.

Suppono in fatti, ed credo sopportare di dipendere, che la sola precauzione consista degli attaccati dal morbo, cui toglie di solo mangiare, il bere negli stessi vasi, sono altrettanto motivi di comunicare la *Tosse Generale* da soggetto a soggetto, e la stessa verità del decorrere nella stessa lesione, senza degli altri, ed ottimali senza le debite precauzioni, io trovo in somma che si aggrava ancor per la *Tosse Generale epidemica*, tutti quei senarii regolamentari, che furono istituiti tanto providamente per preservar gli individui sani da coloro che fossero per averne culto dal *Tajpolo naturale*, terribilissima malattia, la quale s'è di nostri o per le introdotte profilattiche preservazioni, o più ancora per l'introduzione delle Vaccinazioni, ha molto profuso della sua virgola, e si può dire quasi ingratifica, ed esortissima.

E così pure diviene necessaria che un fanciullo, o schiavo che sia ancor dopo superato la malattia, non venga col-

di leggeri rimesso alla considerazione di altri soggetti sani, ed immuni dalla Tosse Convulsiva; mentre esulando dopo un buon corso di tempo, potrebbe il contagio, il quale esisteva ed eliminarsi dall'organismo di un dato corpo, potersi agevolmente ed invadere un altro, che si fosse per la stessa maniera sano, ed illec.

## CAPITOLO IV.

### *Regime Dietetico.*

Ogni buon pratica vorrà ben certo, che la Dietetica in ogni specie di morbo, singolarmente grave, acuto, e contagioso, diviene un oggetto importante da considerarsi nel buon trattamento dello stesso.

Questa regola però deve essere analogo alla natura del rimedio, che si profonde nel medicare la Tosse Convulsiva, e quindi alle varie specie dello stesso morbo.

Non dunque faremo qui un buon corso della dieta particolare, che generalmente conviene meglio nella Tosse Convulsiva.

Ella è pertanto cosa evidente che la tutta il decorso della malattia presenta conviene riguardare l'assorbimento da cibi asci, piccioli, schiagiosi, difficili alla digestione, i quali eccitando l'irritamento intestinale, e specialmente dello stomaco di già mal condò, e malatozato dagl'humidi della predominante Tosse Febile, ne potrebbero accrescere la forza, ed aumentare le emulsioni, gli effluvi, ed i vomiti.

Evelun così fatti cibacci, e sostengono i più facili alla digestione, i più semplici, e sopra tutto i liquori, ed i latticini, se fossero tollerati dall'indole spirituale degli individui, e delle forze dipendenti dai particolari soggetti.

In quanto alle bevande si devono escludere assolutamente le più forti, e spiritose singolarmente in quelle specie di Tosse Convulsiva che più d'ogn'altra si esordisce sotto la forma d'Infiammazione.

Ma non è necessaria al rende il provvedimento profilattico di riguardare l'infirmità delle forti impressioni dell'aria fredda ed essere soltanto subdripida, e delle ingiurie delle tempeste variabili stagionali, e tenuto d'occhi giorni sopra, e barba-sconi, mentre cotante atrocità che si vede i allucano di troppo a mantenere la Tosa Corvuliva moderna.

La violenza dell'infirmità sopra tutto, ed in specialità il capo deve essere riguardato da simili colpi dell'aria, ed fare male a proposito la introducono quei primi pensieri della Frenia, allora quando s'è lasciati tutti della Tosa Corvuliva faremo portare in capo quella sorta di difesa, e cappotto da cui nasce appo loro l'ammazzamento come di Capaulche la stessa Tosa Corvuliva.

Il tutto nei soggetti, che lo possono fare, la stessa Manda equitalente, singolarmente nella Tosa Ipstermarke può di venire un benefizio costante la potenza naturali inangulidici, e costando blandamente la violenza polmonale premiato con la più pronta separazione di quella vanda nuova matura, che così difficilmente viene espulsa singolarmente dei soggetti più deboli, ed umori.

Il riposo nelle ore notturne, che per troppo viene perturbato dalla così frequente inangenza della Tosa Corvuliva, deve essere non ogni possibile mezzo procurato all'infirmità, e ciò fare con gli oppioli a suo luogo richiesti, perchè è per troppo vero, che dalla costanza regita, e dagli inter-sotti sono nella più tenera gioventù, che molto obliagosa di così farsi apati, se destano gravemente danno alla loro salute, che li dispongono a valere delle secondarie malattie alla Tosa Corvuliva, bene spesso langhinosa, e simili, le quali abbiano a suo luogo richiesti, e descritte.

#### ERRORE DELLA PRESENTA MEMORIA.

Rassaggiando la brevi note le sparse filo della presente Memoria, nel primo Capo della prima Parte della stessa o-

hanno provato, che la vera Tossia Generativa Epidemica contagiosa era una malattia appena nota agli antichi Medici occidentali, ed abbiamo fatto la più ragionevole spesa della comparsa di questo terribile male prima nella Francia, che per quasi tutta l'Europa da due secoli soltanto a questa parte; in secondo luogo abbiamo fatto conoscere, che questa malattia nella prima sua comparsa, ed anche per un grandissimo corso di tempi non considerata come un male quasi esclusivamente proprio della nostra facchinaria, quando s'costa giace giacere e diffondersi, ed a improvvisarsi in modo tale alligore, ed attaccarsi come un gran numero di persone solite d'ogni età, e d'ogni sesso non tanto disinganno della loro salute.

Nel secondo Capo abbiamo cercato di esporre con la maggior possibile precisione la vera Tossia della Tossia Generativa, e conclusa un tale proposito le altre più comuni opinioni; indi abbiamo individuato i sintomi, e le differenze essenziali, e caratteristiche, le quali le distinguono dalle altre specie di tossie confondibili e prima giunte con la stessa; indi siamo passati ad investigare le cause primarie esistenti in detta Tossia Generativa, ed abbiamo provato che consiste in un contagio analogo al contagio morbilloso, il quale singolarmente dopo il giure di un certo quasi perenne spazio di anni, si va attivando, e sviluppando or in una, or in un'altra regione, e si dilata epidemicamente, come è ancora costante dei secoli cristiani quasi d'ogni sorta; provato il principio contagioso predominante, abbiamo fatto osservare che la Tossia Generativa può non attaccare più volte uno stesso soggetto non esclusi gli adulti, e bene spesso le giovani lattanti, e le puerpere, che per troppo coltore malarico, qualora vengono colte della Tossia Generativa.

Nel Capo terzo si espone per ora la serie di tutte le malattie con le quali singolarmente si osserva che può accadere la vera Tossia Generativa; e seguita le varie specie del tempo abbiamo indicato, e fatto osservare che questa vera tossia

lo singolarmente fu riscontrato istintivamente congiunto a una  
 le debili epidemie annuali, che a li fortemente dominan-  
 ti; altre volte con morbili epidemici, non più frequentemen-  
 te con questo morbo, che con gli altri, talvolta col guasto  
 epidemico, con la rosolia, con le febbri eruttive veneree,  
 e con altre analoghe costituzioni malarie.

Le distesi della Tossia Contagiosa fanno da nel riposo  
 nel Capo questo, Formano alcune sistemi nella maniera di  
 agire dei contagi, abbiamo provato che talvolta in forma di  
 alcune miasmazioni può una malattia irritativa contagiosa es-  
 sere accompagnata dalla distesi ipostatica, ovvero stato  
 della pervenuta.

E avviene poi la formazione, e la forma tendono ad una  
 delle distesi in molti particolari individui, può nascere nel  
 corso della malattia contagiosa irritativa, così con e ancora il  
 vedere nel progresso di una i fenomeni di aumentato, o di-  
 minuito costantemente, che rende la cosa più complicata, e  
 fastidiosa.

Tutto ciò abbiamo detto che si deve applicare alla Tos-  
 sia Contagiosa; essa è prodotta da un contagio, cioè da una  
 materia irritativa l'area polmonale, ma può essere tanto nel  
 suo progresso accompagnata da uno stato pervenuto, ed ipo-  
 statico, che giura moltissimo il sapere ben conoscere, e sia  
 intervenire.

Nel Capo questo si espongono le cause principali, per  
 le quali si può certamente giudicare, che la Tossia Contagiosa  
 sia divisa in giorni suoi con complicata, e così fre-  
 quente.

Oltre di avere provato che alcune malattie epidemiche  
 contagiose di natura fatale, per cui dire, si sono nella origine  
 degli anni tra di cui quasi costantemente, ed ingratamente, ab-  
 biamo fatto vedere che alcune altre all'opposto a una così  
 più estesa, e complicata, e variabile, tra le cause più più  
 marcate per le quali sembra che anche la Tossia Contagiosa  
 divisa nei suoi giorni, ed universali, e ancora in le stralci-

in condizioni generali della nostra atmosfera, e delle sempre più imperverite stagioni; con altre misurazioni, che complessivamente prese posse avere influito allo stesso disordine.

Quanto dico a' nostri giorni varisi gli ordinamenti, la durata, gli atti delle vere Tasse Consolere epidemiche, lo proviamo nel Capo sesto ed ottavo della prima parte della presente Memoria; abbiamo intesi in questo Capo degli avvertimenti quasi a foggia di aforismi pratici, ne' quali si sono esposti tutte quelle osservazioni, deduzioni, e consigli, mediante i quali si può formare una giusta idea delle varie forme sotto le quali si può presentarsi la Tasse Consolere; del suoi più gravi effetti; del modo al quale più di frequente ella si unisce; della sua durata relativamente al suo stesso grado patologico, alla qualità del soggetto a' quale si attacca; all'indole delle stagioni nelle quali si sviluppa, e si manifesta; in seguito si enumerarono i facili mezzi, che non soltanto la Tasse Consolere tanto nel suo ingresso, quanto nel suo aumento, e finalmente quasi l'ultimo rimedio può ella lasciare dietro a sé nel mal disposti individuali, di mollezza di capo, di petto, di basso ventre tra le più comuni, nocive, e bene spesso mortali; appoggiando tutte le suddette mediche proposizioni aforismatiche al ragionamento possibile, ed all'esperienza.

Passando alla seconda Parte della Memoria che comprende principalmente i varj metodi di cura che sono riservati dal grado particolare, e quasi particolare, non cui si presenta all'occhio del Clinico la Tasse vera Epidemica Consolere; la prima legge abbiamo detta questa cura in tre aspetti, e vogliamo dire curativo, altro è quella infatti che si applica per distruggerla ne' particolari soggetti, a' quali si attacca, altro quella con cui si cerca di renderla meno forte, e terribile in taluna de' suoi azioni; ed altro finalmente quella che può dirsi profilattica, e preservativa, avendo fatto osservare inoltre, che la cura in tutto il suo decorsi può essere vari-

placante irritativa, o irritativo-pacifica od ipostenica, oppure nel suo loggione irritativa; nel suo cammino irritativa ipostenica od ipostenica, o finalmente nel suo principio irritativo-pacifica od in seguito irritativo-pacifica; ed appunto nel primo Caso abbiamo esposta la cura che può convenirvi alla Tossia Corrosiva semplice irritativa; abbiamo recati in questa Cura i sentimenti dei più celebri Autori nel nostro rimedio nella cura della Tossia Corrosiva, voglio dire dell'Eucalio, intorno al qual abbiamo fatto conoscere in quali momenti si debba praticare con maggior accuratezza del buon effetto, quali cautele si devono usare nell'amministrarlo nel varj regimi, ed a qual età, e specie di sintomo si debba dare la preferenza; ne siamo disposti a dimostrare la convenienza del rimedio esposto; ed abbiamo collazionati questi rimedj nelle loro etadi, e quelli praticati dai più accreditati Medici esercitati così curati come fissati, e non quale effetto; poichè abbiamo enumerati, dalla più sana opinione desunti, que'vari rimedj in questi ultimi tempi proposti, quasi specifici, per distinguere siffatta specie di Tossia Ferrea irritativa; in seguito si espose la cura della Tossia Corrosiva semplice irritativa ipostenica, e si fa conoscere sopra ogn'altra come questa sia la convenienza delle depluioni sanguigne nella cura de' casi fatte tali.

Si compitolese perciò le opinioni degli Autori che propongono come indispensabile la Flabotomia costantemente praticata in tali casi; si espongono i segni caratteristici del qual vengano indicato le emulsioni di sangue tanto generali, che parziali, e che e nella stessa tempo dei più gravi pericoli della stessa Tossia ipostenica irritativa, quando fuori del paradosso, colto l'urgenza necessaria riguarda all'età del soggetti colti dalla tosse, al loro temperamento, all'indole stessa della veniente stagione.

Abbiamo esposta la cura della Tossia Corrosiva irritativa ipostenica, considerata tanto in tale età si fosse fino della sua prima origine; quanto in età fosse divenuta spetemi-



ra nel progresso della malattia, ed aveva quasi cambiata la primitiva sua forma, e quindi, si sa esattamente l'indole, la natura, le varietà, e le conseguenze, e discerneremo dei rimedj constants d'ogni sorta proposti dai Medici nella cura di questa specie di tosse, e nel ragionamento, e nelle sperienze si cerca di verificare le nostre idee sull'uso più conveniente degli esistenti strom. nel trattamento di questa ostruzione così tosi.

Si tratta poi di Sviluppare l'argomento naturalmente della complessione delle Tosse Gonorrhoiche con tutti altri malori, de' quali abbiamo a noi lungo trattato, ed abbiamo concluso, che fino a tanto che l'ammalato è combattuto da una tosse primaria, malchè essa più grave della tosse con cui trovasi compiaciuta, corriera avria in tutti il più importante malore, e ad esso produrre la più atroce cura, e esporsi più la virulenza della più importante malattia, sviluparsi a curare la Toss. Gonorrhoica ancor peggiore a carico dell'infelice ammalato; nell'Attacco Oco. della Toss. Gonorrhoica og. si espone la cura che può cominciare perfettamente in ogni stadio di Toss. Gonorrhoica, onde renderlo più utile, come frequente, e non fianco di tosse, e finché conagiarlo, l'Attacco successivo poi è tutto diretto a dare un punto di cura profilattica, e preventiva, onde prevenire la diffusione del contagio della Toss. Gonorrhoica Epidemica, e quindi garantire i particolari individui della famiglia e della intera popolazione del luogo avvenimento d'incontrare casi di leggeri questa sempre malata, e terribile malattia; Escludere si chiede la Mennia presente con prevenire il Regno Divistico che prontamente avviene in questa fase Toss. Gonorrhoica.

*F I N E.*

